

TESTUDO ANGULATA, *Dumeril.*

Testâ oblongâ, ventricosâ ; scuto gulari unico porrecto.

Knorr, Del. Nat. iii. t. lii. p. 2.
Howitt, Liv. Mus. t.—
Testudo angulata. Dumeril, MS. in Mus. Par.—Schweig. Prod. sp. 7.
Testudo Bellii. Gray, Spic. Zool. t. iii. p. 4.
Chersina angulata. Gray, Syn. Rept. t. ii. p. 5.

Habitat in Africâ australi et in Insulâ Madagascar.
Mus. nostr.

Descriptio. *Caput* nigrum, flavo maculatum. *Mandibulæ* flavæ, denticulatæ. *Collum* fuscum, subtùs pallidius, squamis minutis æqualibus tectum. *Pedes anteriores* fusci, squamis imbricatis anticè defensi. *Ungues* acuti, lanceolati. *Pedes posteriores* fusci, squamati. *Cauda* mediocris. *Testa* oblonga, ovata, ventricosa, fornicata, anticè triangulariter emarginata, supra humeros et femora expansa. *Scuta dorsalia* omnia concentricè sulcata, margine nigro, disco luteo : *vertebralia* subplana, areolis piceis, depressis; primum pentagonum, anticè truncatum vel emarginatum, areolâ carinatâ ; secundum et tertium transversè hexagona ; quartum hexagonum, posticè angustius ; quintum hexagonum, anticè productum : *costalia* disco flavo, areolâ piceâ, margine nigro ; primum trapezoideum, margine inferiore rotundato ; secundum et tertium pentagona ; quartum trapezoideum : *marginalia* in partes dimidias obliquè divisa, quarum anterior nigra, posterior major (areolam includens), flava ; primum angulato-prominens ; secundum et tertium declivia, expansa ; quartum ad septimum quadrata, verticalia ; reliqua declivia, margine revoluto. *Scutum nuchale* lineare, anticè flavum : *caudale* latum, gibbosum, incurvum, flavum, plagâ triangulari ad latera, et lineâ centrali, nigris. *Sternum* flavescenti-miniatum (post mortem flavescens), parte mediâ et posteriori plùs minùs nigro umbratâ ; posticè angulato-emarginatum. *Scutum gulare* unicum (quasi scuta bina connata) pentagonum, truncatum, ultra testam superiorem porrectum. *Scuta humeralia* rhomboidea, margine externo rotundato :